

TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT (invazív beavatkozásokhoz: vizsgálat, kezelés, műtét, stb.)

K E M O T E R Á P I A

I. BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Betegünk!

Önnek érdeke és joga is, hogy pontosan megismerje az Ön előtt álló eseményeket, és tájékozottságon alapuló döntést tudjon hozni a gyógyulása érdekében javasolt beavatkozásról. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót. Az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségről, valamint a beavatkozás jelentőségéről, módjáról, következményeiről és a lehetséges szövődményekről.

I. Beavatkozás megnevezése:

Kemoterápia

II. Beavatkozás mentének leírása, ismertetése:

A kemoterápia célja. A kemoterápia a sejtosztódását gátló szerek adásával történik. A kemoterápia célja a daganat méretének és kiterjedésének csökkentése, kimutatható daganat nélküli állapot elérése, a daganat növekedésének gátlása és megállítása, ezáltal ha vannak tünetei (pl. fájdalom, stb.), azok enyhítése és megfelelő életminőség biztosítása a beteg számára. A daganat műtéti úton való eltávolítását követően alkalmazott kemoterápia célja a képalkotó vizsgálatokkal nem kimutatható, de a műtét időpontjában meglévő esetleges ún. mikrometasztázisok (képalkotó vizsgálatokkal nem kimutatható áttétek) felszámolása és ezáltal a kiújulások és visszaesések kockázatának csökkentése.

Hogyan hat a kemoterápia? Ahogy az egészséges sejtek, úgy a daganatsejtek is folyamatos növekedési és osztódási fázisokon mennek keresztül. A kemoterápia hatására a daganatsejtek éleciklusa megszakítható és ezáltal a daganatsejtek nem tudnak osztódni, a daganat nem tud növekedni és áttétet adni. A kezelések során gyakran több szer egyidejű alkalmazására kerülhet sor. A kemoterápiás szer a vérkeringéssel csaknem a szervezet egészébe eljut, ezáltal képes a műtét vagy a sugárkezelés számára hozzáférhetetlen daganatsejtek elpusztítására is. A kemoterápia az aktív, azaz az osztódó sejtekre hat. A daganatsejtek aktív sejtek, de a szervezetben az egészséges sejtek is aktívak. A kemoterápia a daganatsejteken kívül az ép - különösen a gyorsan osztódó - sejtekre is hatást gyakorolhat, ezért ezek egy része is elpusztulhat. Ilyen, gyorsan osztódó sejtek a vérsejtek, a száj- és a tápcsatorna nyálkahártyájának sejtjei, a hajhagymák. A mellékhatások akkor alakulnak ki amikor a kemoterápia ezeket az egészséges sejteket érinti.

A kezelés menete. A daganatos betegség megfelelő kezeléssel az esetek jelentős részében gyógyítható, de kimenetele függ a betegség súlyosságától és előrehaladottságától, számos, előre nem látható szövődménytől, mely lehet a daganatos betegség, de lehet a kezelés következménye is. A kezelések során esetlegesen fellépő mellékhatások

kivédésére (pl. hányinger, hányás, fehérvérsejtszám csökkenése) gyógyszereket kaphat kezelőorvosától.

A kemoterápiás gyógyszerek szájon át, izomba adott injekcióként, intravénás infúzióként, beépített kanülön vagy ún. porton keresztül alkalmazhatóak. A kezelés során állapotának nyomon követése érdekében kontroll vizsgálatokra is sor kerülhet, melyekről orvosai tájékoztatják.

A kezelések ideje alatt törekedjen erőnléti és általános egészségi állapotának megőrzésére. Fordítson figyelmet étrendjére (pl. a kemoterápia ideje alatt fogyasszon könnyű ételeket), a megfelelő mozgásra (pl. naponta séták megtétele), fogyasszon naponta sok folyadékot és szakítson elég időt az alvásra, a pihenésre és a relaxációra.

A kemoterápia lehetséges mellékhatásai. Kemoterápiával számos rosszindulatú daganatot lehet hatásosan kezelni. Mint minden gyógyszeres kezelés, a kemoterápia is okozhat mellékhatásokat. Ezek a mellékhatások változatosak lehetnek és minden betegnél más-más mellékhatás előfordulására lehet számítani. A kialakuló mellékhatások a daganat típusától, szervi elhelyezkedésétől, a kemoterápia típusától és adagjától, illetve a beteg általános állapotától függenek. A különböző kemoterápiák különböző mellékhatásokat okozhatnak. Egyes kemoterápiáknak jellegzetes mellékhatásai vannak.

Az alábbiakban felsorolásra kerülnek a hagyományos kemoterápiákkal előforduló leggyakoribb mellékhatások.

Fáradékonyság. A fáradékonyság azt jelenti, hogy fáradtnak és kimerültnek érzi magát. Gyakori mellékhatása a kemoterápiának.

Fájdalom. A kemoterápia néha fájdalmat okoz, leggyakrabban fejfájást, izomfájdalmat, gyomorfájdalmat. Egyes kemoterápiák jellegzetes mellékhatása az idegi károsodás okozta fájdalom lehet, melyet a végtagokban (a kéz és lábujjakban) jelentkező égőérzés, zsibbadás, érzéketlenség jelenthet. A legtöbb fájdalom-típus a kemoterápiák közötti szünetekben, vagy a kemoterápia befejezése után teljesen megszűnik. A kemoterápia okozta idegi károsodás néha rosszabbodhat a kezelések során. Ha ilyen panasz jelentkezik, a szer adagjának csökkentése vagy az adagolás végleges leállítása válhat szükségessé. Egyes esetekben a kezelés megszüntével ez a típusú fájdalom végleg megszűnik, máskor az idegi károsodás javulása vagy teljes megszűnése néha csak hónapok vagy akár hosszú évek után következik be. Egyes betegeknél az idegi károsodás okozta panaszok végleg fennmaradhatnak. A fájdalom kezelése a fájdalom típusától függ. Tudni kell, hogy a fájdalmat maga a daganat is okozhatja. Épp ezért számoljon be mindig orvosának arról, ha fájdalma van, mert a fájdalom kezelése annak okától és jellegétől függ. Ha a fájdalmat a kemoterápia okozza, akkor orvosától fájdalomcsillapítókat kap és ha indokolt, a kemoterápia adagját módosítani fogja.

Szájban és torokban sebek, fekélyek kialakulása. A kemoterápia a szájban és torokban lévő sejteket is károsíthatja, emiatt sebek vagy fájdalmas fekélyek (mucositis, stomatitis) alakulhatnak ki ezeken a helyeken. Ezek általában a kemoterápia beadása után az 5.ik-14.ik napok között alakulnak ki. A sebek begyulladhatnak, nehezíthetik az étkezést. Ezek megelőzése érdekében nagyon fontos az egészséges étrend és a szájhigiénia betartása, a fogak megfelelő és rendszeres ápolása. Mindezek betartásával csökkenthető ezek kialakulásának kockázata. A kezelés befejezésével ezek a mellékhatások általában teljes mértékben megszűnnek.

Hasmenés. Bizonyos kemoterápiák fokozhatják a bélmozgást és ezáltal hígabb, vagy vizes székletek kialakulását idézhetik elő. A hasmenés korai kezelésével meg lehet előzni a súlyosabb tüneteket, a szervezet folyadék vesztesét és a kiszáradását.

Hányinger és hányás. A kemoterápia hányingert és hányást okozhat. Ezek a mellékhatások a kemoterápia típusától és adagjától függenek. A hányinger és hányás megelőzhető megfelelő gyógyszerek szedésével, épp ezért nagyon fontos, hogy szedje a kezelőorvosa által a hányás és a hasmenés megelőzésére javasolt gyógyszereket.

Székrekedés. A kemoterápia székrekedést is okozhat. Ez azt jelenti, hogy a bélműködés lassúbbá válik és ennek következtében nincs rendszeres székletürítés. Ezt a mellékhatást bő folyadék fogyasztásával, megfelelő étrenddel és a napi rendszerességgel végzett mozgással, tornagyakorlatokkal meg lehet előzni.

Vérkép eltérések. A csontvelőben képződnek az új vörösvérsejtek. A vörösvérsejteknek három fő csoportja van: a vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek (leukociták) és a vérlemezkék (trombociták). A kemoterápia befolyásolhatja a vörösvérsejtek képződését, ennek hatására lecsökkenhet a számuk a vérben. A kemoterápia végleges befejezése után a vörösvérsejtek száma általában visszatér a normális szintre. A kemoterápia ideje alatt kialakuló vérkép eltérések miatt rendszeres vérkép ellenőrzés történik. A csökkent vörösvérsejtszám vérszegénységet okozhat, melynek a tünetei a fáradékonyság, szédülés, fulladás (nehézlégzés) lehetnek. A csökkent fehérvérsejtszám esetén antibiotikus kezelés válhat szükségessé, mivel ilyenkor megnövekedhet a fertőzések kockázata. Ha lecsökken a vérlemezkék száma, akkor nő a vérzésékenység. A vörösvérsejtek számának csökkenésekor bizonyos esetekben a kemoterápia adagját lecsökkentik. A fehérvérsejtek számának csökkenése megelőzhető bizonyos fehérvérsejtszám növelő injekciókkal, a vérszegénységet vas (szájon keresztül vagy vénásan adva) vagy vörösvérsejttranszfúzióval lehet rendezni. A vérlemezkék csökkenése esetén vérlemezke készítmény adható.

Idegrendszeri mellékhatások. Bizonyos kemoterápiák idegi károsodást okozhatnak, melyek tünetei a következők lehetnek: bizonytalan járás, égő érzés, végtagokban gyengeség vagy érzéketlenség, izomgyengeség, izomfájdalom, egyensúlyzavar, remegés, fejfájás, látásprobléma, hallásprobléma, bizonytalan közérzet. Ezek a mellékhatások a kemoterápia befejezésével általában megszűnnek, azonban ritkán ugyan, de véglegesen is megmaradhatnak.

Emlékezőképesség és memória változások. Egyes betegeknél a kemoterápia alatt csökkenhet a koncentrációképesség, a memória és emlékezőképesség.

Szexuális zavarok. A kemoterápia hatással lehet a szexuális életre, a termékenységre, a megtermékenyítő képességre és a magzatra. A kemoterápia hatására nőknél csökkenhet, vagy akár véglegesen megszűnhet a termékenység, férfiaknál csökkenhet a gyermeknemzési képesség. Terhesség alatt a kemoterápia károsíthatja a magzatot. A kemoterápia alatt megfelelő fogamzás elleni védekezés is szükséges.

Étvágycsökkenés, ízérzés- és szagzavarok. Kemoterápia alatt csökkenhet az étvágy, az éhségérzet. Kisebb mennyiségű étel elfogyasztása után is teltségérzés jelentkezhet. Kemoterápia alatt egyes betegeknél íz- és szagérzékelési zavarok léphetnek fel.

Haj- és szőrzet hullása. A kemoterápiának a haj- és a szőrtüszőkre gyakorolt hatása következtében a hajszálak elvékonyodhatnak, vagy akár a haj részleges, vagy teljes

kihullása következhet be. Bizonyos kemoterápiák teljes hajhulláshoz vezetnek. Hasonlóképpen a szőrzet az egész testen kihullhat. A haj-és szőrzethullás az első kemoterápia utáni első hetekben kezdődik el általában. A kemoterápiás kezelés befejezését követően a haj-és szőrnövekedés újra helyreáll.

Szívbetegség. Bizonyos kemoterápiák hatással lehetnek a szívre, épp ezért időközönként a szív ultrahangos vizsgálatát végzik el és ha szükséges, kardiológiai szakvizsgálat is történik.

Hosszútávon megmaradó lehetséges mellékhatások. A kemoterápia okozta legtöbb mellékhatás a kezelés befejezésével megszűnik. Azonban tudni kell, hogy ugyan ritkán, de bizonyos típusú kemoterápiák végleges szív-, tüdő, máj-, vesekárosodást okozhatnak. Egyes betegeknél a termékenységi vagy gyermeknemzési képesség zavara végleges, illetve akár meg is szűnik. A kemoterápia befejezése után bizonyos betegeknél a memóriazavar és a koncentrációképesség zavara is fennállhat még hosszú évekig, vagy akár végleg.

Egyéb lehetséges mellékhatások

Előfordulhatnak olyan mellékhatások is, melyek a bőrt, tüdőt, májat, vesét érintik, mint például: kiütések, nehézlégzés, láz, tüdőgyulladás, májenzimemelkedés, veseműködés csökkenése.

Az infúzió alatt előfordulhat, hogy a véna fala áteresztővé válik és/vagy sérül a véna (a tű vagy a gyógyszerek hatására), így a kemoterápiás szerek kijuthatnak az érpályából és az erek gyulladását, esetleg elhalását okozzák. Ilyen esetekben további orvosi beavatkozás válhat szükségessé.

A mellékhatások az alkalmazott gyógyszertől és a beteg szervezetének egyéni reakciójától függően jelentkezhetnek, különböző lefolyást mutatva. A kezelőorvosok mindent megtesznek, hogy a mellékhatások kockázatát a minimálisra csökkentsék. A mellékhatások többsége spontán vagy gyógyszerek adásával napokon belül megszűnik. Az orvosok a kemoterápiás tervet úgy állítják össze, hogy az egyes kezelések közötti gyógyszermentes szakaszban a szervezet képes legyen regenerálódni.

Lehet-e kezelni a mellékhatásokat? Igen. A kezelőorvos segít abban, hogy megelőzzék és hogy kezeljék a legtöbb mellékhatást. Manapság nagyon sok olyan új gyógyszer áll rendelkezésre, amelyekkel meg lehet előzni, vagy kezelni lehet a kemoterápia okozta mellékhatásokat. A mellékhatások megelőzését és kezelését célzó gyógyszeres kezeléseket palliatív (tüneti) vagy szupportív (támogató) kezelésnek nevezik. A kemoterápiával együtt ezek fontos részét képezik a rosszindulatú daganatok kezelésének. A betegek napjainkban sokkal jobban el tudják viselni a kemoterápiát, a rendelkezésre álló modern tüneti és támogató gyógyszereknek köszönhetően.

III. A beavatkozás elvégzésének lehetséges előnyei:

Korai stádiumú daganat esetében a későbbi visszaesés kockázatának csökkentése. Áttétes stádiumú daganat esetében a daganat okozta panaszok és tünetek enyhítése, a túlélés meghosszabbítása és a lehető legjobb életminőség biztosítása.

IV. A beavatkozás elvégzésének lehetséges kockázata:

Ismertetve a II. pontnál

V. A beavatkozás elmaradásának lehetséges előnyei:

Nincs

VI. A beavatkozás elmaradásának lehetséges kockázata:

Korai stádiumú daganat esetében a daganat kiújulásnak magasabb a kockázata. Áttétes stádiumú daganat esetében nagyobb a valószínűsége a daganat növekedésének és az újabb áttétek kialakulásának.

VII. További beavatkozások, melyek szükségessé válhatnak a javasolt beavatkozás során:

Ismertetve a II. pontnál

VIII. A lehetséges alternatív eljárások, módszerek:

Nincs

IX. A beavatkozás várható kimenetele:

Korai stádiumú daganat esetében várhatóan csökkenni fog a daganat kiújulásának kockázata. Áttétes stádiumú daganat esetében várhatóan megállítható a daganat további növekedése és az újabb áttétek kialakulása.

X. Beavatkozást követő életmód:

Nagyon fontos, hogy a betegek a kemoterápia során odafigyeljenek életvitelükre, a táplálkozásra és az étrendre. A nagyobb volumenű étkezések helyett a napi többszöri étkezés bevezetése ajánlatos, bőséges folyadék fogyasztása mellett. Sokan a kemoterápia előtt vagy alatt próbálnak életmódot váltani, melynek része lehet egy új diéta bevezetése, például a húsmentes étrendre való áttérés. Ez azonban nem a megfelelő időpont ilyen váltásra, különösen, hogy a szervezetnek állati fehérjék bevitelére is szüksége van. A kemoterápia ideje alatt kiegyensúlyozott, vegyes táplálkozásra kell törekedni. A kezelés során energiára, valamint fehérjebevitelre van szükség, mivel a kemoterápia megterheli a szervezetet. A szervezet napi energia igénye 25-30 kcal/ testtömegkg, ezzel a kalória bevittel megelőzhető a fogyás és szinten tartható a testsúly. A bevitt táplálék összetételére is szükséges odafigyelni. Minden típusú fehérje fontos a szervezet számára, ezek fehér húsok, tejtermékek, tojás formájában egyaránt biztosíthatóak. A kemoterápia alatt elsősorban könnyebben emészthető húsok, szárnyasok, halak fogyasztása javasolt. A vörös húsokat lehetőség szerint kerülni kell. Helytelen étrend esetén, pl. az állati fehérjék megvonása esetén a szervezet az izomtömeg bontásával pótolja a fehérjét és ez fogyáshoz vezethet. Zsiradékok tekintetében a kedvezőbb összetételű olajok bevitele előnyös. Újabb adatok szerint főzéshez a kókuszolaj használata javasolt, mivel ez a típusú olaj a legkönnyebben emészthető. A szénhidrátok fogyasztásakor előnyben kell részesíteni a finomított lisztből és cukorból készült pékárukat, tésztákat, édességeket. Többféle ételkészlet választék esetén lehet egészségesebb formát választani, pl. fehér liszt helyett teljes kiőrlésű lisztet, durum tésztát, normál rizs helyett barna rizst és cukor helyett mézet lehet használni. Ha nincs ellenjavallata, akkor növelni kell a rosttartalmú szénhidrátok bevitelét, gyümölcs és gabonarostok formájában. A bevitt táplálék felét zöldség és gyümölcs kell, hogy kitegye. Ezeket lehet nyers állapotban, vagy főzelék, illetve kompót formájában fogyasztani. Továbbá, fontos a napi megfelelő folyadék mennyiségének biztosítása, ezzel a szervezet hidratáltsága és az általános közérzet is javul. Normális körülmények között, ha pl. nem áll fenn vesebetegség - a napi folyadék szükséglet 2-2,5 l, melyet változatos formában lehet bevinni (mint pl. tea, levesek, rostos italok, turmixok). A napi bevitt folyadék mennyiségét mindig meg kell beszélni a kezelőorvossal. Esetenként átmenetileg tápszerek fogyasztása válhat szükségessé, ezek változatos formában állnak rendelkezésre. A táplálkozás napi ritmusát tekintve a

többszöri, alkalmanként kevesebb étel elfogyasztása ajánlatos, legalább négy-öt étkezésre elosztva. Javasolt könnyű ételek fogyasztása, gyakori kis mennyiségben (pl. keksz, joghurt, tápszerek, kompót). Kerülni kell a túl meleg és forró ételek fogyasztását. A zsíros, a nagyon fűszeres és nehezen emészthető ételeket ki kell iktatni az étrendből. A kezelések ideje alatt törekedni kell az erőnléti és az általános egészségi állapot megőrzésére. Fordítson figyelmet étrendjén túl a megfelelő mozgásra, pl. naponta nagyobb sétákat kell megtenni, fizikai állapotának és erőnlétének megfelelően végezzem napi rendszerességgel enyhe-közepes fokozatú tornát és mozgást), és szakítson elég időt az alvásra, a pihenésre.

II. BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

Osztály neve:

Beteg neve:

Születési ideje: **TAJ száma:**.....

A BETEG KEZELŐORVOSA TÖLTI KI:

Egészségi állapot, ennek orvosi megítélése:

.....
.....
.....

A javasolt beavatkozás megnevezése:

.....

A javasolt beavatkozás elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyei és kockázatai a Beteg esetében:

.....
.....
.....

Lehetséges alternatív eljárás, módszer a Beteg esetében:

.....
.....
.....

A beavatkozás elvégzésének tervezett időpontja:

.....

Az ellátás folyamata és várható kimenetele a Beteg esetében:

.....

.....

További ellátások, javasolt életmód a Beteg esetében:

.....

.....

A beteg kérdései:

.....

.....

A kérdésekre adott válaszok:

.....

.....

A fent megnevezett invazív beavatkozásra vonatkozó **egyéniesített, teljes körű tájékoztatást** a betegnek (vagy törvényes képviselőjének, hozzátartozójának) **megadtam**, kitérve a javasolt beavatkozás lehetséges veszélyeire, szövődményeire, a javasolt helyett alkalmazható egyéb alternatív lehetőségekre, azok előnyeire, hátrányaira. A tájékoztatást úgy és olyan mélységig adtam, mely megítélésem szerint a beteg, illetve képviselője számára szükséges, érthető és a beteg állapotában megfelelő.

Kelt: Budapest,

A beavatkozást végző orvos neve:

aláírása, pecsétje

Tisztelt Betegünk!

Orvosa tájékoztatja Önt a betegségével kapcsolatban javasolt invazív beavatkozásról, a lehetséges alternatívákkal együtt. Ellátása során, szakmailag megalapozott, az Ön érdekeit leginkább szolgáló gyógymód kiválasztására kerül sor.

A tájékoztatás meghallgatásához kérheti, hogy hozzátartozója, ápolója, vagy egyéb személy jelen lehessen. A tájékoztatást követően Öntől orvosa a fenti ellátáshoz írásbeli hozzájárulását kéri.

A BETEG (VAGY KÉPVISELŐJE) TÖLTI KI:

1. E nyilatkozatot a Szent Margit Kórház keretében kezelt *[Kérjük, húzza alá a megfelelőt!]*

- **betegként**
- a beteg **törvényes képviselőjeként** adom.

(A beteg képviselője lehet: a törvényes képviselő, pl. gondnoka, gyámja, illetve a beteg közeli hozzátartozója, pl. házastársa, egyenes ágbeli rokona, élettársa, testvére, stb.)

2. **Kijelentem**, hogy kellően megfontolt, befolyástól mentes, önálló döntésem alapján, a lehetséges alternatív gyógymódok és esetlegesen felmerülő szövődmények/kockázatok ismeretében elfogadom a fentiekben megjelölt javasolt invazív beavatkozást, továbbá az előrelátható orvosi intézkedésekkel és kezelésmódokkal egyetértek.

3. **Felkérem és felhatalmazom** a fenti beavatkozást végző orvost arra, hogy a beavatkozás során olyan előre nem látható beavatkozást is elvégezzen, mely orvosilag indokolt, az egészség megóvására irányul, és késedelme életveszélyes állapotot eredményez, illetve tartós egészségkárosodáshoz vezethet.

4. **Egyedül az alábbiakba nem egyezem bele:** *(ha nincs ilyen, kérjük ezt a részt áthúzni)*

.....
.....

(Kérjük, itt jelölje meg, mibe nem egyezik bele akkor sem, ha annak elmaradása az Ön életét veszélyeztetné, vagy Ön számára aránytalanul súlyos terhet, vagy maradandó károsodást jelentene. Ebben az esetben két tanú együttes jelenlétében kell megtenni a visszautasító nyilatkozatot. A nyilatkozatot a tanúk aláírásukkal hitelesítik!)

5. **Tudomásul veszem**, hogy a felajánlott orvosi ellátást elutasíthatom, illetve beleegyezésemet bármikor visszavonhatom. A felajánlott ellátás visszautasítása kapcsán bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógyeredmény alakulásáért orvosaimat felelősség nem terheli. **Tudomásul veszem**, hogy beleegyezésem alapos ok nélküli visszavonása esetén kötelezhető vagyok az ennek következtében felmerült és indokolt költségek megtérítésére.

6. **Tudomásul veszem és elfogadom**, hogy az orvosi beavatkozások eredménye a legnagyobb körütekintés mellett sem garantálható előre és a szakszerű kezelés ellenére is előfordulhatnak nem várt szövődmények, melyek a gyógyulást kedvezőtlenül befolyásolhatják.

7. **Beleegyezem** abba, hogy a beavatkozás során diagnosztikus céllal eltávolított szerveket, szövetmintákat szövettani vizsgálatot követően a laboratóriumban megőrizték.

8. **Hozzájárulok** ahhoz, hogy a beavatkozás menetéről, valamint az anatómiai elváltozásokról fénykép- vagy videofelvétel készüljön, azzal a kikötéssel, hogy a felvételen személyem nem válik felismerhetővé, az kizárólag az érintett területről történik. Abban az esetben, ha az elváltozás jellege olyan, hogy annak dokumentációja során személyem felismerhetővé válik, annak felhasználásához külön engedély szükséges.

9. **Tudomásomra hozták**, hogy a vérkészítmények adásának engedélyezése/nem engedélyezése, valamint a műtéti érzéstelenítésre vonatkozó beleegyező nyilatkozat, külön dokumentumon tehető meg.

10. **Kijelentem**, hogy a javasolt gyógymódról, annak kockázatairól, lehetséges leggyakoribb szövődményeiről és várható következményeiről szóban feltett kérdéseimre is megfelelő válaszokat kaptam, azzal összefüggésben további kérdésem nincs.

11. **Kijelentem** továbbá, hogy fenti nyilatkozataim akaratommal mindenben megegyeznek, kellő idő állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon döntsék a tervezett kezelés elfogadásáról és ezt aláírásommal is megerősítem.

**A beavatkozással kapcsolatban egyéniesített, teljes körű szóbeli tájékoztatást kaptam.
A beavatkozással kapcsolatos betegtájékoztatót elolvastam.**

A beavatkozásra vonatkozó szóbeli tájékoztatás során elhangzottakat és az írásbeli betegtájékoztató tartalmát **megértettem és elfogadom, ezek alapján jelen beleegyező nyilatkozat útján kifejezetten kérem a nevezett beavatkozás elvégzését.**

Kelt: Budapest,
a beteg vagy képviselője aláírása

Név és lakcím (ha nem a beteg, hanem a képviselője írta alá):

.....

Tanúk (*név/aláírás/lakcím*) – ha szóban vagy más módon tette a nyilatkozatot a beteg:

1.

.....

.....

2.

.....

.....

SÜRGŐSSÉG ORVOSI IGAZOLÁSA

A beteg jelenlegi egészségi állapota miatt beleegyező nyilatkozat megtételére nem képes. A képviselője nyilatkozatának beszerzése olyan késedelemmel jár, mely a beteg életét vagy egészségét veszélyezteti, ezért úgy ítéljük meg, hogy sürgősségi beavatkozás elvégzése szükséges.

Kelt: Budapest,

.....
beavatkozást végző orvos
aláírása, pecsétje

.....
osztály-/ügyeletvezető orvos
aláírása, pecsétje